< 4種混合・三種混合・不活化ポリオ>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------|------|--------------------------|
| 3ヶ月以上 | 4回 | 20~56日の間隔で3回 12~18か月後に1回 |

<Hib(インフルエンザ菌b型)感染症>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|------------|------|-----------------------------|
| (標準的な接種時期) | 4回 | |
| 2ヶ月以上 | | 27~56日の間隔で3回(※1) 7~13か月後に1回 |
| 7か月以上1歳未満 | 3回 | |
| | | 27~56日の間隔で2回(※1) 7~13か月後に1回 |
| 1歳以上5歳未満 | 1 回 | 1回のみ |

※1 ただし、医師が必要と認めた場合には20日の間隔で接種することができます。

<PCV7 (小児の肺炎球菌感染症)>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール | |
|------------|------|--|----|
| (標準的な接種時期) | | | |
| 2ヶ月以上7か月未満 | 4 回 | 27~56日の間隔で3回 60日以上あけて1回 1歳までに完了する(※2) (1歳から1歳3か月の | |
| 7か月以上1歳未満 | 3回 | | |
| | | 27日以上の間隔で2回(※2) 60日以上あけて1回(1歳す | ぎ) |
| 1歳以上2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔で2回 | 口 |
| 2歳以上5歳未満 | 1 回 | 1回のみ | |

※2ただし、初回免疫は1歳を過ぎたら行わない(追加免疫は実施可能)

<BCG>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|-----------------------|------|--------|
| (標準的な接種時期) 5ヶ月~8か月 | 1 📵 | 1回のみ |

<B型肝炎>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------|------|--|
| 生後~ | 3 🗓 | 4週間の間隔で2回 1回目の接種から20~24週を 経過した後にに1回 |

予防接種スケジュール

<MR(麻疹・風疹)>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------------------------|------|--------|
| 1 期: 1 歳以上 2 歳未満 | 1 回 | 1回のみ |
| 2期:5歳~7歳未満 (小学校就学前の1年間) | | 1 回のみ |

<日本脳炎> *平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は特例措置の対象となります。

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール | |
|-----------------|------|--------------------|------|
| 1期:3歳以上 | 3 📵 | 6~28日の間隔で2回 おおむね1年 | 後に1回 |
| 2期: 9歳~13歳未満 | 1 回 | 1回のみ | |

<D T 2期>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|-------------------------|------|--------|
| (標準的な接種年齢) 11歳~12歳未満 | 1 回 | 1 回のみ |

< ヒトパピローマウイルス感染症>

| ワクチンの種類 | 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|-----------------|-----------------------------|------|---|
| サーバリックス (2価) | (標準的な接種年齢) 13歳 (中学1年) | 3 回 | 1 か月後 1 回目から6か月後 (※3 1~2.5か月後)(※3 1回目から5~12か月後) |
| ガーダシル (4 価) | 13歳 (中学1年) | 3回 | 2 か月後 (※3少なくとも1 か月以上) 1回目から6 か月後 (※3 2回目から少なく とも3か月以上) |

※3 やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合

<他のワクチンとの接種間隔について>

| <他のワクチンと | の接種間隔について> | | |
|----------|---|--------------|-----------------------|
| 生ワクチン | MR・BCG・ロタ・おたふくかぜ・水痘等 | 27日以上おいて | |
| 不活化ワクチン | 4種混合・三種混合・日本脳炎・インフルエンザ ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がん・B型肝炎等 | 6日以上おいて 他のワク | ≯ 種類の チン |

予防接種スケジュール

<おたふくかぜ>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------|------|--|
| 1 歳以上 | 1 回 | 1回のみ ※2回接種の場合はMRの第2期と同時期 (5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間)に2回目 |

※2回接種は日本小児科学会の推奨内容

<水痘(みずぼうそう)>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------|------|---|
| 1 歳以上 | 1 回 | 1回のみ ※2回接種の場合は1回目接種後3か月以上あけて、2歳未満 に接種することが望ましい。 |

※2回接種は日本小児科学会の推奨内容

<ロタウイルス胃腸炎>

| ワクチンの種類 | 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|----------------|----------|------|----------------------|
| ロタリックス (1価) | 6週齡以上 | 2回 | 4週間の間隔で2回(24週齢までに完了) |
| ロタテック (5価) | 6週齡以上 | 3 回 | 4週間の間隔で3回(32週齢までに完了) |

<A型肝炎>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スク | 「ジュール |
|----------|------|-----------|-----------------|
| 1歳以上 | 3回 | 2~4週あけて1回 | 2 4 週経過した後に 1 回 |

<インフルエンザ**>**

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール |
|------------|-------------|------------------------|
| 6か月以上13歳未満 | 2 🗓 | プロンプロ 2~4週あけて1回 |
| 13歳以上 | 1回 または2回 | (2回接種の場合) 1~4週あけて1回 |

<成人用肺炎球菌感染症(PPV23)>

| 接種開始時の年齢 | 接種回数 | スケジュール | |
|----------|------|-------------------------------|--|
| 2歳以上 | 1 回 | 1回のみ (2回接種の場合は5年以上の間隔をあける) | |